

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -303 /2017d z dnia 28.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 46/2013 z dnia 22.03.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Themar Import - Eksport Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 245C, 05-816 Opacz Kolonia
tel.:22 42 56 743, fax: 22 89 46 000

A B C N A M S Z Y C E A L

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) - **0,015%** (0,15 g/l)

Zezwolenie MRiRW nr R – 46/2013 z dnia 22.03.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 303 /2017d z dnia 28.06.2017 r.



H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego użycia, o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania mszyc i wciornastków na roślinach ozdobnych uprawianych w mieszkaniach, na balkonach i w ogrodach.

Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych szkodników. Roślinę należy równomiernie pokryć cieczą z odległości 20-40 cm tak, aby była wilgotna, łącznie z dolną powierzchnią liści. Unikać tworzenia się ściekających kropeł. Stosować maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, przemiennie z insektycydami posiadającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych niż deltametryna.

Róża

mszyca różano-szczeciowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m².

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml - 110 ml/1m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej **7-10 dni**

Niecierpek nowogwinejski

wciornastek amerykański

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m².

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 170 ml/1m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej **7-10 dni**

Chryzantema

wciornastek amerykański

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m².

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml - 170 ml/1m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej **7-10 dni**

Begonia zimowa

mszyca ziemniaczana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m².

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml - 110 ml/1m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej **7-10 dni**

Bluszcz

mszyca bluszczowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/1m².

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml – 120 ml/1m².

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej **7-10 dni**

UWAGI:

1. Rośliny doniczkowe opryskiwać poza pomieszczeniami mieszkalnymi np. na balkonie, podwórzu.
2. Środek stosować w temperaturze nie wyższej niż 20°C. W dniu upalnym zabieg wykonać pod koniec dnia, a opryskaną roślinę pozostawić na zewnątrz.
3. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika.
4. Podczas opryskiwania roślin uprawianych w ogrodzie nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne, zwłaszcza przeznaczone wkrótce do zbioru (np. rośliny konsumpcyjne można przykryć folią).
5. Podczas opryskiwania roślin należy akwarium przykryć np. folią.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -