

Posiadacz zezwolenia:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – box 9, B – 1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel.: +32 2 627 – 86 - 11, fax: +32 2 627- 86 - 00

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01 - 748 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99

N E M A T H O R I N 1 0 G R

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

fostiazat (związek z grupy fosforoorganicznych) – **100 g/kg (10%)**.

**Zezwolenie MRiRW nr R - 81/2013 z dnia 11.06.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 823/2019d z dnia 13.11.2019 r.**



Niebezpieczeństwo

H 301 – Działa toksycznie po połknięciu.

H 411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH 208 – Zawiera fostiazat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH070-Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

P 264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem

P 330 - Wypłukać usta.

P 391 - Zabrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

NEMATHORIN 10 GR jest środkiem nicieniobójczym w postaci drobnych granul stosowanych doglebowo. Przeznaczony jest do zwalczania mątwika ziemniaczanego w uprawie ziemniaka. W glebie na nicienie działa kontaktowo. Z gleby pobierany jest przez korzenie, w roślinach działa systemicznie. Po pobraniu przez rośliny zabezpiecza korzenie ziemniaka przed wnikaniem larw mątwika.

STOSOWANIE ŚRODKA

ZIEMNIAK

Mątwik ziemniaczany

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Nemathorin 10 GR ogranicza liczebność szkodnika w całym okresie wegetacji ziemniaka. Środek rozsiewać przed sadzeniem bulw równomiernie na całej powierzchni pola stosując aplikator do granulowanych środków ochrony roślin. Środek powinien być wprowadzony do gleby na głębokość 10 - 15 cm.

Wprowadzenie środka do gleby na głębokość większą niż 15 cm zmniejsza skuteczność zwalczania mątwika ziemniaczanego.

Nie można dopuścić do zamoczenia granul przed ich zastosowaniem.

Aplikator do granulatów przed użyciem powinien być czysty i suchy.

Nie należy stosować środka do zwalczania mątwika w przypadku uprawy ziemniaków wczesnych o okresie wegetacyjnym krótszym niż 120 dni.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Stosować rękawice, okulary i ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środka ochrony roślin podczas napełniania aplikatora oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą. Zapewnić, że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

Produkt rozsypany przypadkowo zebrać aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Ziemniak – 120 dni.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 32°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Substancja aktywna fostiazat jest inhibitorem cholinoesterazy. Objawy zatrucia – nadmierne pocenie, ból głowy, osłabienie, omdlenie i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiegokolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeżeli znana jest przyczyna zatrucia wówczas należy: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia :Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -